

RECHERCHE CLINIQUE EN CANCÉROLOGIE

Newsletter - Nord-Pas-de-Calais

ACTUALITÉS


RESEAU D'ADRESSAGE DU CLIP² LILLE : BILAN DE L'ANNEE 2025

→ Et si votre patient était éligible à un essai clinique dès maintenant?


Adressez le rapidement au CLIP² Lille sur [Klineo](#) pour augmenter ses chances d'inclusion !

Les essais de phase précoce limitent de plus en plus le nombre de lignes antérieures.


Fiches avec un essai proposé dans les centres StarCC 59/62



Répartition des fiches selon le statut de l'établissement



Dossiers transmis à Paris et à Bruxelles



FORMATIONS CLIP² X STARCC : BILAN DE 5 ANS D'EXISTENCE

→ Nous remercions sincèrement l'ensemble des médecins et intervenants qui nous ont fait l'honneur d'animer un cours. Vous avez largement contribué à la réussite de ces formations !

Formations dispensées

35

Inscriptions

1596

Départements
représentés lors
des formations

5

Etablissements
représentés lors des
formations

32

→ Retour sur l'enquête de satisfaction envoyée en novembre 2025 : Nous remercions l'ensemble des répondants. N'hésitez pas à nous partager par mail vos suggestions de formations.

43

REPDONDANTS



100%


PARTICIPANTS RECOMMANDENT
LES FORMATIONS A LEURS
COLLEGUES

4.81 / 5


EVALUATION MOYENNE




Profession des répondants




Evaluation du contenu



Fréquence de participation aux formations



ÉVÈNEMENTS



→ Stratégies thérapeutiques en oncologie – [Inscription ici](#)

- Actualités dans la prise en charge des lymphomes – Dr Bossard – 31/03/2026 13h à 14h
- Actualités dans la prise en charge des cancers du sein métastatiques – Dr Stern – 07/04/2026 13h à 14h

→ Webinaire juridique organisé par le GIRCI Nord-Ouest en collaboration avec le Cabinet Houdart & associés :
" Nouvelle version des Bonnes Pratiques Cliniques ICH E6 (R3) : quelles évolutions ? " - 16/03/2026 11h à 12h30
[Inscription ici](#) gratuite mais obligatoire

ÉTUDES INTERVENTIONNELLES NOUVELLEMENT OUVERTES



Cliquez sur la rubrique souhaitée pour y accéder.

DERMATOLOGIE

ENDOCRINOLOGIE

GYNÉCOLOGIE

HÉMATOLOGIE

NEUROLOGIE

ORL

PATHOLOGIES
DIGESTIVES

PÉDIATRIE

PNEUMOLOGIE

SÉNOLOGIE

UROLOGIE

AUTRES
LOCALISATIONS

CONTACTS



C. Ratajczak
celine.ratajczak@chu-lille.fr

A. Acroute
aurore.acrouteditvampouille@chu-lille.fr

DERMATOLOGIE



- **IGNYTE-3 / RP1-104**

Étude clinique de phase 3 randomisée, contrôlée et multicentrique comparant le Vusolimogene Oderparepvec en association avec le Nivolumab au traitement choisi par le médecin chez des patients atteints d'un mélanome avancé ayant progressé malgré un traitement contenant des anti-PD-1 et des anti-CTLA-4.

- **TeLuRide-006 / EIK1001-006**

Étude de phase 2/3 adaptative, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée versus comparateur actif, visant à évaluer la sécurité d'emploi et l'efficacité de l'EIK1001 en association avec le pembrolizumab par rapport au placebo et au pembrolizumab comme traitement de première intention chez des patients atteints d'un mélanome avancé.

ENDOCRINOLOGIE



Pas de nouvelle étude sur la période.

GYNÉCOLOGIE



- **DESTINY-OVARIAN01 / DS8201-772**

Étude de phase III, multicentrique, randomisée, en ouvert, évaluant le trastuzumab déruxtécán en association avec le bévacizumab par rapport au bévacizumab en monothérapie, en tant que traitement d'entretien de première ligne du cancer de l'ovaire exprimant HER2.

- **IMGN853-0425 / M25-236**

Étude de phase 2 randomisée, ouverte, du mirvetuximab soravtansine chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, du péritoine primitif ou des trompes de Fallope de haut grade, avancé et résistant au platine, présentant une forte expression du récepteur alpha du folate testant deux schémas d'administration pour l'optimisation de la dose, avec une cohorte distincte pour déterminer la dose initiale chez les patientes présentant une insuffisance hépatique modérée.

- **TroFuse-022 / MK-2870-022**

Étude de phase 3, randomisée, ouverte et multicentrique visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité du traitement d'entretien par sacituzumab tirumotecan avec ou sans bevacizumab par rapport au traitement standard après une chimiothérapie de deuxième ligne à base de platine chez des participantes atteintes d'un cancer de l'ovaire récurrent sensible au platine.



→ LEUCÉMIES

- **DSP-5336-101**

Étude de phase 1/2, ouverte, d'escalade et d'expansion de la dose de DSP-5336 chez des patients adultes atteints de leucémie aiguë avec ou sans réarrangement de la leucémie à lignée mixte (MLL) ou mutation de la nucléophosmine 1 (NPM1).

→ LYMPHOMES

Pas de nouvelle étude sur la période.

→ MYÉLOME

- **PHILAE / M25-586**

Étude de Phase 2/3, Multicentrique, Randomisée, en Ouvert, évaluant l'efficacité et la sécurité de l'Etentamig et du Daratumumab (Etentamig+D) par rapport au Daratumumab, au Lénalidomide et à la Dexaméthasone (DRd) chez des patients atteints d'un Myélome Multiple nouvellement diagnostiqué et non éligibles à une greffe.

→ AUTRES HÉMOPATHIES

- **FIRST ALLO MDS**

Greffe à partir d'un donneur familial en première intention pour les patients atteints de syndrome myélodysplasique : une étude de phase 2.

- **WAZABI / FILOWM4**

Etude en ouvert de phase 2 évaluant l'efficacité de l'association du zanubrutinib et du BGB611417 chez des patients précédemment traités pour une macroglobulinémie de Waldenström.

NEUROLOGIE



Pas de nouvelle étude sur la période.

ORL



- **BI 1501-0002**

Essai clinique randomisé ouvert de phase Ib visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité du BI 770371 en association avec le pembrolizumab, avec ou sans cétuximab, par rapport à la monothérapie par pembrolizumab pour le traitement de première intention des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou (CETC) métastatique ou récidivant.

- **IDEAL / GORTEC 2024-03**

Essai de phase II, randomisé, évaluant le traitement d'induction par l'anti PD1 Pucotenlimab et l'EGFRADC MRG003 ou l'induction par l'EGFR-ADC MRG003 seul, suivi par une radiochimiothérapie dans les cancers épidermoïdes localement avancés de la tête et du cou.

- **OrigAMI-5**

Une étude de phase 3, randomisée, en ouvert, multicentrique de l'amivantamab en plus du carboplatine et du pembrolizumab, comparée au traitement standard à base de platine et de pembrolizumab et de 5-FU, chez des participants atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou récurrent/métastatique n'ayant jamais été traité.



→ CANCER COLORECTAL

- **ULYSSE / PRODIGE 115- (FFCD 2406)**

Une étude randomisée de phase II, ouverte, non comparative et randomisée comparant un doublet de chimiothérapie de deuxième ligne (FOLFOX ou FOLFIRI) plus fruquintinib à un doublet de chimiothérapie (FOLFOX ou FOLFIRI) plus bevacizumab dans le cancer colorectal métastatique.

→ CANCER OESOGRASTRIQUE

- **BGB-A317-316**

Étude clinique multicentrique randomisée de phase 3 en ouvert visant à évaluer le tislélizumab administré par injection sous-cutanée par rapport à une perfusion intraveineuse associée à une chimiothérapie en traitement de première intention chez des patients atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-oesophagienne localement avancé non résécable ou métastatique.

- **FRUQUITAS / ENGIC 06 (PRODIGE 114) – FFCD 2401**

Essai randomisé de phase III comparant le trifluridine/tipiracil + fruquintinib au trifluridine/tipiracil seul chez les patients atteints d'un adénocarcinome oeso-gastrique métastatique.

- **GRACIE**

Etude de phase II évaluant l'ivonescimab en association avec la chimiothérapie en première et deuxième ligne de traitement chez des patients atteints d'adénocarcinome gastrique et gastro-oesophagien avancé ou métastatique.

- **NEEDS**

Chimioradiothérapie néoadjuvante pour le carcinome épidermoïde de l'œsophage versus chimiothérapie définitive avec chirurgie de sauvetage si nécessaire (essai NEEDS).

→ CANCER DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES

- **ARTEMIDE-HCC01 / D7029C00001**

Etude multicentrique de phase III, randomisée, en ouvert, en aveugle pour le promoteur, évaluant le rilvégostomig en association avec le bévacizumab avec ou sans trémélimumab, en traitement de première ligne chez des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire avancé.

- **DESTINY-BTC01 / DESTINY-Biliary Tract Cancer-01**

Étude de phase III évaluant l'administration du Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) et du Rilvégostomig par rapport au traitement standard à base de Gemcitabine, Cisplatine et Durvalumab en première ligne du cancer des voies biliaires localement avancé ou métastatique exprimant HER2.

- **IOSPHERE**

Étude prospective, ouverte et multicentrique visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de la radiothérapie interne sélective, utilisant des microsphères de verre marquées à l'yttrium-90, suivie du tremelimumab et du durvalumab pour le traitement du carcinome hépatocellulaire avec thrombose de la veine porte.

→ MULTI-LOCALISATIONS DIGESTIVES

- **ACUPOX / ACUPOX G 114**

Etude GERCOR de phase II multicentrique en 2 cohortes pour évaluer l'intérêt de l'acupuncture sur la neuropathie périphérique induite par l'oxaliplatine chez des patients atteints de tumeurs solides gastro-intestinales ayant arrêté une chimiothérapie à base d'oxaliplatine.

- **FUDOSE**

Individualisation des doses de fluoropyrimidines en fonction du phénotype de la dihydropyrimidine deshydrogénase (DPD) chez les patients atteints de cancers gastro-intestinaux et présentant un déficit en DPD.

PÉDIATRIE



Pas de nouvelle étude sur la période.



→ CANCER DU POUMON

- **DESTINY-Lung06 / DS8201-793**

Essai de phase 3, multicentrique, randomisé et ouvert, comparant le trastuzumab deruxtecan en association avec le pembrolizumab à une chimiothérapie à base de platine en association avec le pembrolizumab, en tant que traitement de première ligne chez des participants atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules non épidermoïde localement avancé non résécable ou métastatique surexprimant HER2 et présentant un score TPS PD-L1 < 50 %.

- **TARLANEC / GCO-003**

Etude randomisée de phase III comparant le tarlatamab à une chimiothérapie standard chez des patients pré-traités présentant un carcinome neuroendocrine pulmonaire ou gastro-entéropancréatique peu différencié de stade avancé.

→ MÉSOTHÉLIOME

Pas de nouvelle étude sur la période.

SÉNOLOGIE



- **INAVO123 / WO45654**

Une étude de phase III, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo évaluant l'efficacité et l'innocuité de l'inavolisib plus un inhibiteur de CDK4/6 et du létrozole versus placebo plus un inhibiteur CDK4/6 et du létrozole chez les patients atteints de cancer du sein avancé endocrine sensible, PIK3CA-muté, Récepteur hormonal positif, HER2 négatif.

- **IZABRIGHT-Breast01 / CA244-0008**

Étude de l'izalontamab Brengitecan (BMS-986507) comparant le traitement choisi par le médecin chez des patients atteints d'un cancer du sein triple négatif non traité, localement avancé, récidivant, inopérable ou métastatique, non éligible aux traitements à base d'anti-PD-(L)1.

- **OPT-PEMBRO / UC-BCG-2401**

OPTimiser la prescription adjuvante de PEMBROlizumab chez les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif au stade précoce ayant obtenu une réponse pathologique complète après une chimiothérapie néoadjuvante standard associée à un traitement par pembrolizumab.

- **REGAIN**

Cancer du sein et chimiobrain: effets de la photobiomodulation sur l'amélioration des troubles cognitifs perçus.

UROLOGIE



→ CANCER DE LA VESSIE

- **TROPION-Urothelial03 (TU03) / DS1062-328**

Une étude randomisée, ouverte, phase 2/3 comparant Datopotamab Deruxtecán (Dato-DXD) plus carboplatine ou cisplatine par rapport à la gemcitabine plus carboplatine ou cisplatine chez des patients atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique.

→ CANCER DE LA PROSTATE

- **MEVPRO-1 / C2321014**

Étude de phase 3, randomisée, en ouvert visant à évaluer le PF-06821497 (mevrometostat) en association avec l'Enzalutamide versus l'Enzalutamide ou le Docétaxel chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration précédemment traité par acétate d'Abiratérone.

- **XALute / AMG 20230005**

Étude de phase 3, ouverte, multicentrique et randomisée, comparant le xaluritamig au cabazitaxel ou à un deuxième traitement ciblant les récepteurs androgéniques chez des sujets atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et ayant déjà reçu une chimiothérapie.

AUTRES LOCALISATIONS



SARCOME

- **StrateGIST-3 / 300383**

Une étude de phase 3, randomisée, multicentrique et ouverte sur l'IDRX-42 (GSK6042981) par rapport au sunitinib chez des participants atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) métastatiques et/ou non résécables après un traitement par l'imatinib.



TOUTES TUMEURS

- **ALE.P02.01**

Étude de phase I/II, multicentrique, en ouvert, portant sur ALE.P02 (anticorps conjugué ciblant la claudine 1) en monothérapie chez des patients adultes atteints de tumeurs solides épidermoïdes CLDN1+ avancées ou métastatiques sélectionnées.

- **OASIS / UC-TRA-2507**

Méthodes optimales pour caractériser la résistance aux ADC dans les tumeurs solides et identifier des biomarqueurs cliniquement utiles.