StARCC
& CLIP² Lille

ÉDITION #23
Novembre 2026

RECHERCHE CLINIQUE EN CANCÉROLOGIE

Newsletter – Nord-Pas-de-Calais

ACTUALITÉS

NOUVELLES ADHESIONS A StARCC



StARCC souhaite la bienvenue à ses nouveaux adhérents :

→ **Pôle Lille Métropole (groupe Ramsay Santé)** comprenant :
- Hôpital Privé Le Bois - Lille
- Hôpital Privé La Louvière - Lille
- Hôpital Privé de Villeneuve-d'Ascq
- Clinique de la Victoire - Tourcoing

→ **Centre Hospitalier d'Hazebrouck**







Le **rapport d'activité de l'année 2025 du réseau StARCC est disponible** sur le site du GIRCI Nord-Ouest.
Vous pouvez le retrouver ici.

ÉVÈNEMENTS



→ Formations Stratégies thérapeutiques en oncologie – **Inscription ici**

- **La prise en charge des sarcomes** – Dr Lebellec – 03/12/2026 13h à 14h
- **La recherche en Sciences Humaines et Sociales : spécificités et utilité** – Pr Lamore – 21/01/2027 13h à 14h
- **Les soins de supports en oncologie** – Dr Lemaire – 09/02/2027 13h à 14h

→ **Rappel :** soirée **" Actualités en Oncologie 2026 post-congrès "** organisée par Alliance Cancer
Le 24 novembre à partir de 17h à Lille Grand Palais
Pour une restitution ciblée des messages clés issus des congrès internationaux 2026 (ASCO/ESMO)
Programme détaillé et inscription gratuite obligatoire ici avant le 13/11/2026 !

→ Les **webinaires juridiques** organisés par le GIRCI Nord-Ouest c'est fini pour 2026…
Mais donnez votre avis et partagez vos idées pour l'année 2027 !
Participez à l'enquête ici ou via le QR Code

→ Le dispositif **StARCC fêtera bientôt ses 10 ans !**
La réussite du projet tient à l'implication de tous : établissements partenaires, médecins, équipes de recherche, ARC du réseau StARCC.
Evénement à venir au cours du premier semestre 2027 !



ÉTUDES INTERVENTIONNELLES NOUVELLEMENT OUVERTES

Cliquez sur la rubrique souhaitée pour y accéder.

DERMATOLOGIE | ENDOCRINOLOGIE | GYNÉCOLOGIE
HÉMATOLOGIE | NEUROLOGIE | ORL
PATHOLOGIES DIGESTIVES | PÉDIATRIE | PNEUMOLOGIE
SÉNOLOGIE | UROLOGIE | AUTRES LOCALISATIONS

CONTACTS

StARCC Recherche Clinique en Cancérologie NORD-OUEST

CLIP² LILLE
CENTRE LABELLISÉ INCA DE PHASE PRÉCOCE ADULTE ET PÉDIATRIE
ALLIANCE CANCER – CENTRE OSCAR LAMBRET
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE

C. Ratajczak
celine.ratajczak@chu-lille.fr

A. Acroute
aurore.acrouteditvampouille@chu-lille.fr
E. Moutailler
elodie.moutailler@chu-lille.fr

ALLIANCE CANCER · CHU LILLE · Centre Oscar Lambret · inca Institut National du Cancer · LA LIGUE CONTRE LE CANCER · GIRCI Nord Ouest · ars Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

DERMATOLOGIE

- **SUPRAME / IMA203-301**

Essai clinique de phase 3 prospectif, multicentrique, en ouvert, randomisé, contrôlé activement, en groupes parallèles visant à évaluer l'efficacité, la sécurité d'emploi et la tolérabilité de l'IMA203 comparativement à un traitement choisi par le chercheur chez des patients atteints d'un mélanome cutané non résécable ou métastatique, ayant déjà reçu un traitement (ACTengine® IMA203-301)

ENDOCRINOLOGIE

- **ADJUPANET**

Premier essai d'adjuvant dans les tumeurs neuroendocrines pancréatiques agressives localement reséquées : une étude de phase III randomisée, étudiant l'efficacité de la chimiothérapie systémique

GYNÉCOLOGIE

CANCER DE L'ENDOMÈTRE

- **RAINBO POLEmut-BLUE**

Etude de phase II sur la thérapie adjuvante sur mesure dans le cancer de l'endomètre avec mutation POLE, de stade précoce à haut risque, sous étude A (RAINBO POLEmut-BLUE : Essai plateforme TransPORTEC – Optimisation du traitement adjuvant du cancer de l'endomètre basé sur ses caractéristiques moléculaires)

HÉMATOLOGIE

LEUCÉMIES

- **EVOLVE-1 / HOVON-173 AML**

Étude visant à étudier l'effet de l'ajout du vénétoclax au traitement par ivosidénib et azacitidine chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) présentant une anomalie génétique spécifique, qui n'ont pas été traités auparavant et qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie intensive

- **EVOLVE-2 / HOVON-177 AML**

Étude de phase III visant à évaluer l'effet d'un traitement d'appoint par révuménib associé au vénétoclax et à l'azacitidine chez des patients atteints d'une leucémie myéloïde aiguë (LMA) avec mutation du gène NPM1 ou réarrangement du gène KMT2A nouvellement diagnostiquée, qui sont inéligibles à des schémas thérapeutiques intensifs

- **FAST-TRACK / BG-75202-102**

Étude de phase 1a/1b évaluant la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l'efficacité préliminaire du BG-75202 en monothérapie et en association avec d'autres agents chez des patients atteints d'hémopathies malignes myéloïdes

- **KOMEN-017**

Études de phase III randomisées, en double aveugle, contrôlées contre placebo, visant à évaluer le ziftoménib en association avec un traitement standard non intensif (vénétoclax+azacitidine) ou un traitement intensif (7+3) chez des patients atteints d'une leucémie aiguë myéloïde avec mutation de NPM1 ou réarrangement de KMT2A non traitée

- **REVEAL-ND NPM1 / SNDX-5613-0710**

Étude de phase 1a/1b évaluant la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l'efficacité préliminaire du BG-75202 en monothérapie et en association avec d'autres agents chez des patients atteints d'hémopathies malignes myéloïdes

LYMPHOMES

- **ICP-CL-00128**

Étude de phase III randomisée, en double aveugle, multicentrique, contrôlée par placebo, portant sur l'orélabrutinib en association avec la bendamustine et le rituximab (BR) par rapport à l'association BR chez des patients atteints d'un lymphome à cellules du manteau n'ayant pas été traité

- **PALISADES-2 /KT-US-740-0603**

Etude de phase III, randomisée, en ouvert, multicentrique, évaluant l'efficacité du KITE-753 par rapport a l'axicabtagene ciloleucel chez des participants atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après un traitement de première ligne

- **RT-4**

Preuve de concept pour la surveillance en temps réel multicentrique de la maladie résiduelle mesurable (MRD) par TEP et ADN tumoral circulant (ctDNA) dans les lymphomes à cellules B agressifs

MYÉLOME

- **CEVOLUTION / CO46096**

Étude de phase III, randomisée, en ouvert, multicentrique évaluant l'efficacité et la sécurité d'emploi du cevostamab en association avec le pomalidomide et la dexaméthasone par rapport au traitement de référence chez des patients atteints d'un myélome multiple ayant reçu une à trois lignes de traitement antérieures

- **DURGA 4 / D8311C00001**

Étude de phase 3, ouverte, randomisée et multicentrique comparant l'AZD0120, une thérapie par cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) autologue à double cible dirigée contre BCMA et CD19, aux schémas thérapeutiques standards chez des participants atteints de myélome multiple en rechute et/ou réfractaire

- **LINKER-SMM2 / R5458-HM-24145**

Étude de phase III, randomisée et en ouvert évaluant le linvoseltamab par rapport au daratumumab chez des participants atteints d'un myélome multiple indolent à haut risque de développer un myélome multiple

- **MEZI-KD**

Étude multicentrique de phase 2, à bras unique, testant le Mezigdomide, le carfilzomib et la dexaméthasone (480kd) chez des patients atteints de myélome multiple réfractaire ou en rechute

- **PASCA -MM**

Essai contrôlé randomisé PASCA. Impact du programme PASCA (PArcours de Santé au cours du CAncer) sur les complications associées au myélome multiple et/ou à ses traitements dans le contexte d'une première autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, chez l'adulte âgé de 18 à 70 ans

- **TRIlogy-5 / 79635322MMY3002**

Étude randomisée de phase 3 comparant le JNJ-79635322 au Teclistamab chez des participants atteints d'un myélome multiple en rechute ou réfractaire après 1 à 3 lignes de traitement antérieures, incluant un anticorps anti-CD38 et du Lénalidomide

- **TRIlogy-7 / 79635322MMY3004**

Etude de phase 3, randomisée, comparant le ramantamig en association avec le daratumumab versus, au choix de l'investigateur, l'association daratumumab, bortézomib, lénalidomide et dexaméthasone (DVRd) ou l'association daratumumab, lénalidomide et dexaméthasone (DRd) chez des participants atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué pour lesquels une greffe de cellules souches hématopoïétiques n'est pas prévue comme thérapie initiale

AUTRES HÉMOPATHIES

- **MANIFEST-3**

Étude de phase 3, randomisée, en double aveugle, avec contrôle actif, comparant le pelabresib (DAK539) associé au ruxolitinib versus placebo associé au ruxolitinib, chez des patients adultes atteints de myélofibrose et naïfs de tout traitement par inhibiteur de JAK

NEUROLOGIE

Pas de nouvelle étude sur la période.

ORL

- **ILLUMINE / GORTEC 2024-04**

Essai de Phase III, multicentrique, randomisé, en ouvert, évaluant l'ivonescimab seul ou avec le ligufalimab versus pembrolizumab en première ligne de traitement des patients ayant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou métastatique ou en récidive

PATHOLOGIES DIGESTIVES

CANCER COLORECTAL

- **CIRCULATE III / UC-GIG-2410**

CIRCULATE III - Adapter la décision de chimiothérapie adjuvante en utilisant l'ADN tumoral circulant chez les patients atteints de cancer colorectal de stade III

- **NACRE-2 / UC GIG 2408**

Etude de phase III, randomisée, évaluant deux stratégies de traitement pour le cancer rectal localement avancé, chez des patients de 75 ans et plus

- **PROCEADE-CRC-03 / MS914001_0002**

Étude de phase III, randomisée, en ouvert, à 3 bras, évaluant le Précemtabart Tocentécan avec ou sans bévacizumab par rapport à l'association trifluridine/tipiracil plus bévacizumab chez des participants atteints d'un cancer colorectal métastatique préalablement traité

- **ROSETTA CRC-203 / CA266-0003**

Étude de phase II/III, randomisée, en aveugle, évaluant le pumitamig en association avec une chimiothérapie versus le bevacizumab en association avec une chimiothérapie chez des participants présentant un cancer colorectal, naïf de traitement, inopérable ou métastatique

CANCER DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES

- **IMMUNO-TH**

Étude de la tolérance du traitement par Atezolizumab/Bevacizumab chez des patients transplantés hépatiques atteints de carcinome hépatocellulaire avancé

- **PEHRICCA / PRODIGE 118**

ECISGEM + rilvegostomig péri-opératoire dans le cholangiocarcinome intra-hépatique résécable à haut risque de récidive

- **RIS-TH**

Intérêt de la transplantation hépatique dans le cholangiocarcinome intra-hépatique localement avancé après radiothérapie interne sélective à l'Yttrium marqué et chimiothérapie : une étude de phase 2

CANCER DU PANCRÉAS

- **3082-CL-0301**

Étude de phase 3, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de l'ASP3082 en association avec le mFOLFIRINOX ou le NALIRIFOX en traitement de première ligne chez des participants atteints d'un adénocarcinome pancréatique métastatique porteur de la mutation KRAS G12D

- **NEOPREDICT A / PRODIGE 104**

Un essai multicentrique de phase II utilisant des signatures transcriptomiques pour personnaliser la chimiothérapie néoadjuvante pour les patients atteints d'adénocarcinome canalaire pancréatique borderline résécable

- **RASolute 304 / RMC-6236-304**

RASolute 304 : Étude de phase III multicentrique, en ouvert, randomisée, à 2 bras, comparant le daraxonrasib en traitement adjuvant à une simple surveillance après la fin d'une chimiothérapie néoadjuvante et/ou adjuvante, chez des patients ayant eu une résection d'un adénocarcinome canalaire du pancréas (ACCP)

PÉDIATRIE

- **EsPhALL2022 / AALL2131**

Étude pilote internationale associant une chimiothérapie et un inhibiteur de tyrosine kinase avec le blinatumomab chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë B à chromosome Philadelphie positif ou analogue de classe ABL nouvellement diagnostiquée

- **INTER-EWING-1**

Programme de recherche clinique international pour l'amélioration de la prise en charge des patients nouvellement diagnostiqués d'un sarcome d'Ewing – Essai INTER-EWING-1

PNEUMOLOGIE

CANCER DU POUMON

- **LIMPID / IFCT-2502**

Essai de phase II évaluant le traitement de 1ère et de 2ème ligne des patients présentant un Cancer du Poumon Non à Petites Cellules de stade avancé et une Pneumopathie Interstitielle Diffuse

- **OliGRAIL**

OLIGRAIL : Première ligne thérapeutique standard incluant l'immunothérapie associée aux traitements locaux ablatifs pour les patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules oligométastatique : une étude de phase III randomisée, ouverte, multicentrique

- **ROSETTA Lung-201 / CA266-0001**

Etude de phase 3, randomisée, multicentrique, en ouvert, comparant le Pumitamig en monothérapie au Durvalumab chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade III non résécable, sans progression après une chimioradiothérapie concomitante à base de sels de platine

- **STX-721-101 / PFL721CI101**

Première étude chez l'homme portant sur le STX-721-101/PFL-721 chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique porteur de mutations liées à des insertions dans l'exon 20 de l'EGFR

MÉSOTHÉLIOME

Pas de nouvelle étude sur la période.

SÉNOLOGIE

- **INVINCIBLE-4-SAKK**

Administration intratumorale d'INT230-6 suivie d'une chimio-immunothérapie néoadjuvante chez des patients atteints d'un cancer du sein triple négatif (CSTN) au stade précoce. Étude clinique de phase 2 randomisée à deux cohortes en mode ouvert

- **NoLEEta**

Retrait de la chimiothérapie dans le cancer du sein précoce à risque intermédiaire RH+ HER2- traité par Ribociclib (LEE011) en situation adjuvante, essai de phase III de non-infériorité

UROLOGIE

CANCER DE LA VESSIE

- **7465-CL-0209 / EV-209**

Étude de phase II en ouvert, à bras unique, visant à évaluer l'association enfortumab vedotin plus pembrolizumab pour la préservation de la vessie chez des participants atteints d'un cancer de la vessie infiltrant le muscle (EV-209)

- **SURF303 /T YR300-203**

Étude de phase 2A/B, multicentrique, en ouvert, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité du dabogratinib (TYRA-300) chez des participants atteints d'un carcinome urothélial des voies urinaires supérieures de bas grade (SURF303)

- **UUTICaD**

Intérêt de l'IRM dans le diagnostic des tumeurs invasives de la voie excrétrice urinaire supérieure

CANCER DE LA PROSTATE

- **DE-ESCALATE / EORTC 2238**

Thérapie de privation androgénique intermittente à l'ère des inhibiteurs de la voie de signalisation des récepteurs des androgènes (AR) ; une étude de phase 3 randomisée pragmatique

- **XALience / Amgen 20230239**

Étude de phase III, multicentrique, randomisée, en ouvert, comparant le xaluritamig plus abiratérone au traitement choisi par l'investigateur chez des participants atteints de cancer métastatique de la prostate résistant à la castration et naïf de chimiothérapie

CANCER DU REIN

- **CANIQOL**

Suivi numérique des symptômes auto-déclarés par les patients traités par cabozantinib associé au nivolumab pour un carcinome rénal à cellules claires avancées

- **PEAK-1**

Essai de phase 3 multicentrique, randomisé, contrôlé, en double aveugle, de Casdatifan et Cabozantinib contre placebo et Cabozantinib chez des patients atteintes d'un carcinome rénal à cellules claires métastatique

AUTRES LOCALISATIONS

SARCOME

- **StrateGIST Frontline / GSK 306293**

Étude de phase 3, randomisée, multicentrique, en ouvert, comparant le velzatinib (GSK6042981) à l'imatinib chez des participants atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) métastatiques et/ou non résécables, non traitées antérieurement

MULTI-LOCALISATIONS

- **AMGEN 20240031**

Étude de phase 1/1b évaluant la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l'efficacité de l'AMG 410 seul et en association avec d'autres agents chez des participants atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques présentant une altération du gène KRAS

- **KONQUER-101 / TBBO11818-101**

Étude de phase 1a/1b en ouvert visant à évaluer la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique, et l'efficacité du BBO-11818 chez les patients atteints de cancers avancés à mutation KRAS

- **MountainTAP-5 / CA240-0005**

Étude de phase 2, multicentrique, en ouvert, visant à évaluer le BMS-986504 en monothérapie et en association avec d'autres agents chez des participants atteints de tumeurs solides avancées et/ou métastatiques présentant une délétion homozygote du gène MTAP